

A stylized landscape illustration featuring rolling green hills in the foreground, a small tree with purple and pink foliage on the left, and blue and white wavy bands in the background representing mountains or clouds. The text 'Casos para discussão' is written in a brown, cursive font on the right side of the image.

Casos para discussão

Mãe de gemelares inicia prática de cangurú na UTI Neonatal. O primeiro gemelar apresenta infecção por MRSA. Preocupado com risco de transmissão para RN saudável devo interromper o Cangurú?

a) Sim, para ambos.

b) Não, pois o Cangurú é extremamente importante para o desenvolvimento dos dois gemelares e o risco/benefício é maior.

c) Realizo consulta com o SCIH para compartilhar a responsabilidade e os riscos para esta prática.



Mãe de gemelares inicia prática de cangurú na UTI Neonatal. O primeiro gemelar apresenta infecção por MRSA. Preocupado com risco de transmissão para RN saudável devo interromper o Cangurú?

-
- b) Não, pois o Cangurú é extremamente importante para o desenvolvimento dos dois gemelares e o risco/benefício é maior.



"Método Mãe-Canguru" (Ministério da Saúde),
consiste no contato pele-a-pele (*posição canguru*)
precoce entre a mãe e o recém-nascido de baixo
peso. Vantagens...

Vínculo



Controle térmico


Redução infecção

Aleitamento materno

Autoconfiança




*Redução permanência
Hospitalar.*



Como eu Faço??

- Se possível mantenha o método cangurú.
- O pai pode participar deste método e realizar cangurú exclusivamente com o RN infectado.
- Durante a visita os pais iniciam sempre o contato com RN sem infecção e finalizam a visita pelo Bebe infectado, não retornando mais ao outro gemelar.
- Pela proximidade do RN a mãe pode utilizar máscara cirúrgica na tentativa de evitar colonização nasal (Recomendação sem referência)
- Se por acaso a infecção ocorrer no período em que ambos estão amamentando?



**Gestante realiza cesárea na vigência de uma
virose gastrointestinal.
Onde deverá permanecer o RN ?**

- a) RN deve permanecer em alojamento conjunto com a mãe para evitar a transmissão para os demais RN evitando assim a transmissão e um possível surto?
- b) RN permanece no berçário completamente isolado até que mãe apresente melhoras dos sintomas.
- c) O RN pode freqüentar o quarto da mãe porém não recebe cuidados da mesma.



Condutas Gerais

- Respeitar a fase aguda da doença onde ocorre grande eliminação do agente infeccioso
- Neste período RN deverá permanecer exclusivamente no berçário sem contato com a mãe
- Amamentação fica interrompida neste período. RN recebe fórmula. Nas situações em que houver condições mãe pode realizar ordenha no quarto e o leite deverá ser pasteurizado
- Quando houver contato da mãe com o bebê se ainda houver risco de fase de transmissão o mesmo deverá permanecer em alojamento conjunto não retornando mais para o berçário.